

Methylprednisolon kuur

Hoe werkt het?

Methylprednisolon (Solu-Medrol) is een ontstekingsremmende stof die erg lijkt op bijnierschors hormoon. Dit middel wordt voorgeschreven om herstel tijdens/na een Schub te versnellen. Bij al langer bestaande klachten kan er een tijdelijke verbetering optreden. Het effect van de kuur kan per keer verschillen.

Methylprednisolon heeft invloed op uw afweersysteem. Daarom mag dit niet gegeven worden als u een onbehandelde infectie heeft.

Gebruik andere medicijnen

In het algemeen heeft behandeling met methylprednisolon geen gevolgen voor de behandeling met andere medicijnen die u wegens MS gebruikt. Als u interferon of Copaxone gebruikt, moet u daar gewoon mee doorgaan tijdens de methylprednisolon behandeling.

Toediening

Methylprednisolon wordt per infuus gegeven. In het algemeen wordt bij een eerste kuur 500 mg methylprednisolon per dag gedurende 5 dagen voorgeschreven.

Wanneer een eerste kuur zonder problemen verloopt, kan een volgende kuur in 3 dagen (en dan 1000 mg per dag) worden gegeven. Het kan ook zijn dat uw behandelend neuroloog bij een eerste kuur 3 dagen 1000 mg per dag voorstelt.

Meestal wordt een methylprednisolon kuur poliklinisch gegeven. U krijgt elke dag een nieuw infuus waarbij gedurende 1 of 2 uur de medicatie wordt toegediend (1 of 2 zakjes). Wanneer de medicatie ingelopen is, wordt het naaldje verwijderd en kunt u naar huis. In overleg kunt u eventueel worden opgenomen in het ziekenhuis voor de kuur.

Bijwerkingen

Tijdens de kuur kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

- Een vieze smaak in de mond
- Een opgejaagd gevoel
- Slecht slapen
- Een rood en/of opgeblazen hoofd
- Hartkloppingen
- Maagklachten

Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard.

Methylprednisolon kan een verhogend effect op de bloeddruk hebben. Daarom zal de bloeddruk tijdens de kuur gecontroleerd worden door de verpleegkundige van de (poli)kliniek.

Bij mensen die ook suikerziekte hebben is het van belang om tijdens en na het infuus de bloedsuikerwaarden extra te controleren. Er kan een ontregeling optreden.

Bijwerkingen zoals die gezien worden bij langdurig gebruik (bijvoorbeeld een opgezet gelaat of botontkalking) komen zelden voor bij de door ons voorgeschreven korte kuren.

Wanneer effectief

Sommige MS patiënten bemerken al tijdens het inlopen van de medicatie vermindering van hun klachten, bij anderen duurt dit enkele weken. Tot 6 weken na

de kuur kan de verbetering beginnen. Verbetering die na die tijd begint, komt waarschijnlijk niet meer van de Methylprednisolon, maar van het lichaam zelf. Het kan ook zijn dat de kuur geen effect heeft op de klachten.

Na de kuur.

Na de kuur krijgt u een afspraak mee bij uw behandelend neuroloog, dit zal ongeveer 6 weken na de kuur zijn. De afspraak kan een controle bezoek zijn of een telefonische afspraak.

Vragen?

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de MS-telefoon of uw behandelend neuroloog. De MS-telefoon is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10.00-11.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur, nummer 020-4440775.