



methyprednisolon- kuur

Uw behandelend neuroloog heeft een methyprednisolon-kuur voorgeschreven. In deze folder krijgt u informatie over de kuur.

Werking

Methyprednisolon (Solu-Medrol®) is een ontstekingsremmende stof die erg lijkt op bijnierschorsormoon. Dit middel wordt voorgeschreven om herstel tijdens/na een Schub te versnellen. Bij al langer bestaande klachten kan er een tijdelijke verbetering optreden. Het effect van de kuur kan per keer verschillen.

Methyprednisolon heeft invloed op uw afweersysteem. Daarom mag dit niet gegeven worden als u een onbehandelde infectie heeft.

Interactie met andere MS-medicijnen

In het algemeen heeft behandeling met methyprednisolon geen gevolgen voor de behandeling met andere medicijnen die u wegens MS gebruikt. Als u interferon of Copaxone® gebruikt, moet u daar gewoon mee doorgaan tijdens de methyprednisolon-behandeling.



Toediening

Methylprednisolon wordt per infuus gegeven.

In het algemeen wordt bij een eerste kuur

500 mg methylprednisolon per dag

gedurende vijf dagen voorgeschreven.

Wanneer een eerste kuur zonder problemen

verloopt, kan een volgende kuur in drie dagen

(en dan 1000 mg per dag) worden gegeven.

Het kan ook zijn dat uw behandelend

neuroloog bij een eerste kuur drie dagen

1000 mg per dag voorstelt.

Meestal wordt een methylprednisolon-kuur

poliklinisch gegeven. U krijgt elke dag een

nieuw infuus, waarbij gedurende een of twee

uur de medicatie wordt toegediend (een of

twee zakjes). Wanneer de medicatie ingelopen

is, wordt het naaldje verwijderd en kunt u

naar huis. In overleg kunt u eventueel worden

opgenomen in het ziekenhuis voor de kuur.

Bijwerkingen

Tijdens de kuur kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

- Een vieze smaak in de mond
- Een opgejaagd gevoel
- Slecht slapen
- Een rood en/of opgeblazen hoofd
- Hartkloppingen
- Maagklachten

Deze bijwerkingen zijn van tijdelijke aard.

Methylprednisolon kan een bloeddruk verhogend effect hebben. Daarom zal de bloeddruk tijdens de kuur gecontroleerd worden door de verpleegkundige van de (poli)kliniek.

Bij mensen die ook suikerziekte hebben, is het van belang om tijdens en na het infuus de bloedsuikerwaarden extra te controleren.

Er kan namelijk een ontregeling van de suikerziekte optreden. Bijwerkingen zoals die gezien worden bij langdurig gebruik (bijvoorbeeld een opgezet gelaat of botontkalking), komen zelden voor bij korte kuren.

Effect

Sommige MS-patiënten bemerken al tijdens het inlopen van de medicatie vermindering van hun klachten, bij anderen duurt dit enkele weken. Tot zes weken na de kuur kan de verbetering beginnen. Verbetering die na die tijd begint, komt waarschijnlijk niet meer van de methylprednisolon, maar van het lichaam zelf. Het kan ook zijn dat de kuur geen effect heeft op de klachten.

Na de kuur.

Na de kuur krijgt u een afspraak mee voor ongeveer zes weken later. De afspraak kan een controlebezoek zijn bij uw behandelend neuroloog of een telefonische afspraak.

Vragen

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw behandelend neuroloog of tot de verpleegkundig consulent. Zij is bereikbaar via de MS-telefoon op maandag, woensdag en donderdag van 10.00-11.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur, (020) 444 0775.