

OPAT


Antibiotica thuis via het infuus

Na overleg door uw behandelend arts met het OPAT-team (Ontslagen Patiënten met Antibiotica Thuis-team) is besloten dat u naar huis kan met intraveneuze antibiotica. Intraveneus betekent letterlijk: in de aderen. Intraveneuze antibiotica wordt vaak in het ziekenhuis gegeven, maar als langere behandeling via het infuus nodig is kan dit ook veilig in de thuissituatie. Om dit te organiseren is het OPAT-team opgericht. Deze folder geeft u hier meer informatie over.

Sommige infecties hebben langdurig intraveneuze antibiotica nodig. U start met de antibiotica in het ziekenhuis en de behandeling kan thuis veilig en op een effectieve manier worden voortgezet. Uw arts bepaalt de duur van de antibioticatherapie.

PICC-lijn

Voor het toedienen van antibiotica in de thuissituatie is vaak een speciaal infuus nodig: een zogenoemde PICC-lijn. Dit is een infuus dat in de ader van de bovenarm geplaatst wordt en vlak boven het hart uitmondt. Na het inbrengen van de PICC-lijn bevindt een deel van de infuus zich buiten het lichaam. De antibiotica zit in een pomp en wordt aangesloten op de PICC-lijn.



Na plaatsing van de PICC-lijn kunnen de volgende complicaties optreden:

- Bloedverlies bij de insteekplaats
- Bloeduitstorting
- Pijn bij de insteekplaats

Deze klachten zijn normaal direct na plaatsing van de PICC-lijn. De klachten horen na een dag te verbeteren.

Leefregels bij een PICC-lijn

U ondervindt nauwelijks hinder van de katheter. Houd wel rekening met het volgende:

- Douchen is toegestaan, baden en zwemmen wordt afgeraden.
- Het meten van de bloeddruk mag niet aan de arm waarin zich de PICC-lijn bevindt,

omdat de katheter hierdoor verstopt of beschadigd kan raken.

- Bloedafname - anders dan uit de PICC-lijn - is aan die arm niet toegestaan, omdat de katheter aangeprikt zou kunnen worden.
- U mag niet onder uw oksels omhoog getild worden, omdat de PICC-lijn dan kan verschuiven.

Monitoren van de behandeling thuis

- Het OPAT-team maakt voordat u naar huis gaat een plan met welke bloedonderzoeken (labcontroles) er wekelijks moeten plaatsvinden en controleert deze uitslagen.
- Er komt dagelijks een verpleegkundige van de thuiszorg bij u thuis om de medicatie toe te dienen en om de PICC-lijn te verzorgen.
- De transferafdeling van het ziekenhuis maakt de nodige afspraken met de thuiszorg.

Voordelen

De antibiotica kan worden toegediend in uw vertrouwde omgeving. U heeft meer vrijheid dan wanneer u verblijft in het ziekenhuis en kan vrijwel alle dagelijkse activiteiten hervatten.

Nadelen

Er kunnen complicaties optreden. Dit kan zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie gebeuren. Mogelijke complicaties zijn bijwerkingen en/of een allergische reactie op de antibiotica en problemen van de PICC-lijn, bijvoorbeeld een infectie of trombose van de lijn.

Wanneer moet u contact opnemen

Complicaties zijn zeldzaam, echter kunnen zowel thuis als in het ziekenhuis voorkomen. Aarzel niet om contact op te nemen indien u zich zorgen maakt. Telefoonnummers vindt u aan het eind van deze folder.

Neem **direct** contact op met het OPAT-team in de volgende gevallen (binnen kantoor tijden):

- Koorts (temperatuur van 38,5 graden of hoger, als u prednison gebruikt boven de 37,5 graden) en/of koude rillingen.
- Tekenen van trombose: pijn aan de arm of schouder, zwelling en/of roodheid
- Tekenen van ontsteking bij de insteekopening van de PICC-lijn, zoals vocht en/of pus, roodheid, zwelling of pijn.
- Complicaties zoals huiduitslag, ernstige diarree, zwelling van het gezicht, tekenen van kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies.
- Bij problemen met de PICC lijn. bijvoorbeeld bij beschadiging van de infuuslijn (barst in

de lijn), geblokkeerde infuuslijn, loslaten van het afsluitdopje en als de katheter naar buiten lijkt te schuiven. Probeer in geen geval de katheter terug te schuiven. Fixeer de katheter met een extra stuk pleister op uw arm.

- Bij problemen met de pomp kunt u direct bellen met de thuiszorg. Zij kunnen contact opnemen met de leverancier van de pompen: Mediq Tefa. De leverancier is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor vragen over de pomp.

Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost bij u in de buurt of met de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC.

Telefoonnummers

Spoedgevallen: (020) 444 3636,
24 uur per dag bereikbaar

OPAT-team: 06 2571 6483
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00
E-mail: Ateam-vumc@amsterdamumc.nl

Mediq teva: (030) 282 1204
24 uur per dag bereikbaar