

Tabel 1 Wanneer behoor ik tot de risicogroep?¹

Belangrijkste risicofactor

- leeftijd boven de 70 jaar, voor mensen met MS leeftijd boven de 60 jaar

Bijkomende risicofactoren

- chronische luchtweg- of longproblemen, die behandeling door een longarts nodig maken.
- chronische hartproblemen, die behandeling door een cardioloog nodig maken.
- suikerziekte, die slecht ingesteld is en/of met complicaties verloopt.
- nierziekte met noodzaak tot dialyseren of niertransplantatie.
- verminderde weerstand tegen infectie door:
 - geen of niet werkende milt
 - bloedziekten
 - medicijngebruik bij kanker (binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling).
 - HIV die niet is behandeld of met een CD4 getal lager dan 200/mm³.
 - ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is van een arts.
- ernstige leverziekte.
- ernstig overgewicht.

Bijkomende risicofactoren vanwege diagnose MS

- progressieve MS
- bij het lopen een hulpmiddel nodig hebben
- verminderde weerstand tegen infectie door:
 - bepaalde medicijnen (zie Tabel 2)
 - recente stamceltransplantatie (zie Tabel 2)

¹ gebaseerd op uitwerking advies [RIVM](#) en [MSIF](#) (MS International Federation) op basis van 'expert opinion' door MS werkgroep NVN,