Niet-ingedaalde zaadbal


(retentio testis)

Uw kind is patiënt bij de afdeling kinderurologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties.

Daarom kan het gebeuren dat u een afspraak heeft bij uw kinderuroloog en een andere dokter aantreft. Hij of zij werkt zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van uw kinderuroloog. Spreekt u liever uw eigen kinderuroloog, geef dit dan aan als u een afspraak maakt. Indien mogelijk proberen wij met uw wens rekening te houden.

Uw kind wordt behandeld voor een scrotale afwijking, een zogenoemd niet ingedaalde zaadbal (retentio testis). Op zijn laatst 6 maanden na de geboorte horen de zaadballen vanuit de buikholte in de balzak te zijn gedaald. Bij uw kind is dat niet gebeurd. Een operatie is noodzakelijk om de zaadbal op te sporen en in te laten dalen. Zou dat niet gebeuren dan kan het nadelig zijn voor de vruchtbaarheid bij uw kind. Bij sommige kinderen is de zaadbal niet aangemaakt of, soms al voor de geboorte, verschrompeld.

De operatie
De ingreep vindt onder narcose plaats. De anesthesist informeert u over de narcose. Een kind blijft soms na de operatie een nachtje in het ziekenhuis op de kinderafdeling. Een van de ouders kan in het ziekenhuis overnachten. De meeste kinderen kunnen op de dag van operatie al weer naar huis.



Voor de operatie
De dag voor de operatie hoort u van de afdeling Opname of uw kind voor de operatie nog mag eten en drinken. Verder is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe verloopt de operatie
De ingreep bij uw kind kan op 2 manieren plaatsvinden.
- De kinderuroloog heeft bij uw kind de zaadbal gevoeld in de lies. In de lies wordt een sneetje gemaakt. De zaadbal wordt opgezocht en via een tweede sneetje in de balzak vastgezet. De wond wordt onderhuids gehecht en met een pleister afgeplakt. Deze ingreep duurt ongeveer 45 minuten.
- De zaadbal is niet gevoeld bij uw kind. De kinderuroloog zal dan een kijkoperatie (laparoscopie) uitvoeren bij uw kind. Voor een laparoscopie wordt een laparascoop

gebruikt. Dit is een lange dunne holle buis met aan het uiteinde een lens. Via een gaatje in de buikholte wordt zo de zaadbal naar de balzak gebracht. Na afloop van de operatie komt er een pleister op de wond. Deze ingreep duurt ongeveer 90 minuten.

Soms ligt de zaadbal in de buikholte en is het niet mogelijk deze met één operatie naar de balzak te brengen. De bloedvaten zijn daarvoor soms te kort. Om lengte te winnen, wordt de hoofdvaatvoorziening van de bal doorgeknipt. De zaadbal moet dan overleven op zijn reserve vaatvoorziening, die zich verder moet ontwikkelen. Soms kan dit in één operatie, soms in twee. In het laatste geval zal ongeveer zes maanden na de eerste ingreep een tweede operatie worden uitgevoerd. Na deze moeilijke operaties is de kans dat de testikel te weinig bloedvoorziening overhoudt en klein wordt 25 procent = 1 op 4. Soms is er geen zaadbal te vinden of is er een klein verkleefd zaadballetje. In het laatste geval zal de kinderuroloog ervoor kiezen om het balletje weg te nemen.

Na de operatie
Eenmaal weer thuis kan uw kind twee tot drie dagen last hebben van de ingreep. Tijdens deze dagen kunt u uw kind tegen de pijn een paracetamol zetpil geven. Afhankelijk van de leeftijd kunt u de dosering aanhouden zoals in onderstaand schema is aangegeven.

Dosering paracetamol
Kind van 0 tot 1 jaar: 120 milligram (3 à 4 zetpillen per 24 uur)
Kind van 1 tot 3 jaar: 240 milligram (3 à 4 zetpillen per 24 uur)
Kind van 3 jaar en ouder: 500 milligram (3 à 4 zetpillen per 24 uur)
Mocht uw kind na drie dagen nog wat pijn hebben, dan kunt u nog een zetpil geven.

Afhankelijk van de ingreep komt uw kind na enkele weken tot na een paar maanden voor controle op de polikliniek Kinderurologie. U dient contact op te nemen met het ziekenhuis als uw kind veel bloed verliest, als uw kind koorts krijgt (meer dan 38,5 ˚C) of als de wond rood wordt.
De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Informatie' in deze folder.

Veel gestelde vragen
Gaat de hechtpleister er vanzelf af?
Meestal zal de pleister er in bad of onder de douche vanzelf af gaan en hoeft er geen nieuwe pleister meer op. Is de pleister er na tien dagen niet afgegaan, dan kunt u de pleister er zelf afhalen. Alle hechtingen lossen vanzelf op.

Mag mijn kind in bad of onder de douche?
Ja, maar laat uw kind de eerste twee weken niet te lang in bad of onder de douche, maximaal tien minuten.

Mag mijn kind weer alles doen na de operatie?
De eerste paar dagen heeft uw kind wat last van de ingreep. Maar in principe kan uw kind weer alles zelf doen.

Wanneer mag hij weer zwemmen?
Uw kind mag twee weken na de ingreep niet zwemmen. In het meeste zwembadwater zit chloor en dat is niet goed voor het genezingsproces.

Hoe zit het met sporten?
Is uw kind in de leeftijd dat hij op een sport zit, dan mag hij twee weken
niet sporten. Dit is om uw kind te beschermen tegen harde ballen bij sporten zoals bij

voetbal, hockey enzovoorts.

Mag hij mee doen aan gym op school?
Ook hier geldt dat uw kind twee weken niet mee kan doen aan schoolgym.

Is mijn kind nu minder vruchtbaar?
De kans op schade door de operatie aan de bloedvaten van het balletje of aan de zaadleider is erg klein. Wel kan een balletje in aanleg van mindere kwaliteit zijn. Een operatie zal dit niet verbeteren, maar verdere verslechte- ring wordt mogelijk voorkomen. Na de pubertijd is het pas mogelijk aan te geven of hij minder vruchtbaar is. Mist uw kind een zaadbal dan kan hij minder vruchtbaar zijn. In de praktijk hebben mannen met maar één zaad- bal nauwelijks minder kans op vaderschap dan mannen met twee zaadballen.

Is het erfelijk?
Nee, een niet ingedaalde zaadbal is niet erfelijk.

Informatie
Als u zich ongerust maakt of vragen heeft over diagnose, onderzoek of behandeling van uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen tijdens het verpleegkundig spreekuur van de afdeling urologie via (020) 444 0229.
Het verpleegkundig spreekuur is bereikbaar van maadag tot en met vrijdag van 08.15 uur tot 9.15 uur en van 13.00 tot 14.00 uur.

Voor spoedeisende zaken kunt u het ziekenhuis bereiken:
- tijdens kantooruren, via de polikliniek urologie op nummer (020) 444 1103;
- buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen, (020) 444 4444 en vragen naar de dienstdoende uroloog.

Daarnaast kunt u terecht op de website www.VUmc.nl en dan doorklikken naar urologie.

Tot slot
Deze folder bevat algemene informatie. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.

213026 - ©amsterdamumc - 2020-08-06 - vumc.nl