Naaldbiopt van de borst

Mammabiopsie

Op grond van eerder gedaan onderzoek is voor u een naaldbiopt van de borst afgesproken bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. Dit onderzoek wordt poliklinisch verricht.
Meldt u zich op de locatie die in uw afsprakenbrief staat.

Het onderzoek
De radioloog neemt bij dit onderzoek met een biopsienaald weefsel uit de borst voor verder onderzoek. De patholoog zal dit weefsel onder de microscoop onderzoeken om een definitieve uitspraak te doen over de aard van de afwijking. Dit kan een aantal dagen duren.
Bij de biopsie wordt gebruik gemaakt van echografie of speciale röntgenfoto's (zie hieronder). Bij iedere vrouw bekijkt de radioloog op welke manier de biopsie het beste kan worden gedaan. De ingreep wordt poliklinisch onder plaatselijke verdoving verricht.
Het is raadzaam om de dag van het onderzoek geen bloedverdunnende middelen te nemen waaronder aspirine en ibuprofen. Paracetamol mag wel.
Ook is het aan te raden een goed aansluitende BH te dragen. Door de druk van de BH op het wondje kan een bloeduitstorting voorkomen worden.
Het is aan te raden u te laten begeleiden of te laten ophalen.

Biopsie met behulp van echografie
U ligt op uw rug op een onderzoekstafel. De te biopteren plaats wordt door de radioloog eerst nauwkeurig bepaald. De radioloog verdooft de huid en maakt een klein sneetje in de huid waarna de bioptnaald wordt ingebracht. Op het moment dat het biopt wordt genomen, hoort u een klik. Deze klik wordt veroorzaakt door het apparaat waarmee het biopt wordt genomen. Er worden minimaal drie of meer biopten genomen. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Biopsie met behulp van speciale röntgenfoto's, zgn. stereotactisch biopt
Ter voorbereiding op de biopsie wordt meestal een extra mammografie-foto gemaakt. Meldt u zich daarom tien minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de radiologie.
Tijdens het onderzoek ligt u op de buik op een speciale biopsietafel.
Het is belangrijk dat u langere tijd, ongeveer 30 tot 60 minuten, op uw buik kunt liggen. In de tafel bevindt zich een opening waar de borst in hangt. De borst wordt tijdens de hele procedure iets samengedrukt. De te biopteren plaats wordt eerst nauwkeurig bepaald, waarna de huid wordt verdoofd. De radioloog maakt een klein sneetje in de huid waardoor vervolgens de bioptnaald wordt ingebracht. Er worden meerdere biopten genomen. De biopten worden ter controle gefotografeerd. Het kan zijn dat er daarna extra biopten moeten plaatsvinden. Na het biopt wordt er via de bioptnaald een marker achtergelaten. Tijdens het onderzoek worden er meerdere keren controlefoto's gemaakt. Het onderzoek

duurt gemiddeld 45 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt de plaats van het biopt afgedekt met een hechtpleister en een drukverband. 's Avonds voor het slapen mag het drukverband verwijderd worden. De hechtpleisters moeten drie dagen blijven zitten. Het is raadzaam om de eerste 24 uur na het biopt de borst niet nat te maken, niet te sporten of intensieve arbeid te verrichten. De patholoog die het weefsel onderzoekt, geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Van hem of haar krijgt u vervolgens de uitslag op uw eerstvolgende afspraak.

Tot slot
Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in staat de gemaakte afspraak na te komen, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. Het telefoonnummer vindt u hieronder.
Bij vragen kunt u altijd bellen. Afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde (020) 444 2874.

509009 - ©amsterdamumc - 2019-08-12 - vumc.nl