

Röntgenonderzoek van de baarmoeder

Hysterosalpingografie

In het kader van het vruchtbaarheidsonderzoek is voor u een röntgenonderzoek van de baarmoeder en eileiders afgesproken. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn in de baarmoeder of aan de eileiders en of deze doorgankelijk zijn.

Het onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd op een moment in de cyclus dat de menstruatie net voorbij is, maar de eisprong nog niet heeft plaatsgevonden. Als dit niet mogelijk is, wordt het onderzoek uitgevoerd na de eisprong.

Het is erg belangrijk dat alle kans op een zwangerschap uitgesloten is ten tijde van het onderzoek. Dit betekent geen geslachtsgemeenschap tot de foto gemaakt is. Als er toch gemeenschap heeft plaatsgevonden, zal het onderzoek geen doorgang vinden.

Voor het maken van de afspraak belt u op de eerste dag van de menstruatie naar de poliklinische zorgen eenheid voortplantingsgeneeskunde (VPG). Het onderzoek vindt plaats op een dinsdag- of op een vrijdagmiddag. Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de radiologieafdeling in het ziekenhuis (kliniek) op de tweede etage.

Vorbereiding

Het advies is om op de avond voor het onderzoek 2 tabletten Naproxen (maximaal 250 mg per tablet) in te nemen. Op de dag van het onderzoek neemt u 2 uur vòòr het onderzoek ook 2 tabletten Naproxen in. U kunt deze tabletten kopen bij de drogist / apotheek.

Gebruikt u bloedverdunnende middelen, neem dan 2 tabletten paracetamol (max 500mg per tablet). Voor dit onderzoek hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden. U kunt gewoon eten en drinken alvorens u zich op de radiologieafdeling meldt.

Het onderzoek

Tijdens dit onderzoek ligt u op de tafel van het röntgenapparaat. Er wordt een speculum (spreider) in de vagina gebracht en de baarmoederhals wordt schoongemaakt met betadine (soort jodium). Hierna wordt een klein plastic cupje op de baarmoederhals aangesloten. Aan dit cupje zit een slangetje en via dit slangetje wordt met behulp van een pompje langzaam een contrastmiddel ingespoten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof wordt op een televisiescherm meegekeken hoe de vloeistof door de baarmoeder en eileiders loopt. Dit kan als reactie pijnlijke baarmoederkrampen geven; de Naproxen onderdrukt deze krampen grotendeels.

Er worden dan enkele foto's gemaakt door de röntgenlaborant. Als de baarmoeder of eileiders zijn afgesloten, kan de vloeistof niet vrij doorlopen. Na afloop gaat u een stukje lopen en wordt er nog een foto gemaakt. Deze laatste foto wordt ongeveer 30 minuten na de eerste serie foto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof komt via de natuurlijke weg weer uit de baarmoeder, net als bij de menstruatie. U krijgt een maandverband na het onderzoek. Na het onderzoek zullen de krampen snel wegtrekken. U kunt enige dagen last houden van bloederige/verkleurde afscheiding. Wanneer u buikpijn houdt, de buikpijn toeneemt in de dagen na het onderzoek of indien er koorts ontstaat dient u contact op te nemen met de afdeling voorplantingsgeneeskunde of buiten kantoor tijden met de spoedeisende hulp.

De foto's worden besproken in het gynaecologisch team. Hier wordt ook besproken wat de volgende stap in de behandeling is. Uw behandelend arts zal de uitslag van het onderzoek mededelen. De datum waarop dit gebeurt, krijgt u te horen van de medewerker op het moment dat u de afspraak voor het onderzoek maakt.

Tot slot

Het contrastmiddel bevat jodium, indien u overgevoelig bent voor jodium, zegt u dit dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of de röntgenlaborant.

Als u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, meldt u dit dan alstublieft tijdig bij de afdeling voortplantingsgeneeskunde.

Vragen

Indien u vragen heeft, of een afspraak wilt maken, kunt u tussen 09.30 en 11.30 uur bellen met de polikliniek: (020) 444 1190. Bij het keuzemenu kiest u in dit geval niet voor afspraken maar voor *medisch inhoudelijk overleg voortplantingsgeneeskunde*.