

Efudix® crème

(fluoro-uracil)

Efudix® crème bevat een stof (fluoro-uracil) die snel delende cellen, zoals kanker cellen, beschadigt. Deze eigenschap maakt Efudix® crème geschikt voor de behandeling van huidafwijkingen waarbij de celdeling veranderd is, zoals de huidaandoening actinische keratose (een verhoorningsstoornis), de ziekte van Bowen, oppervlakkige vormen van het Basaalcelcarcinoom of gewone wratten.

Hoe moet ik Efudix® gebruiken?

- Breng een dunne laag Efudix® crème tweemaal daags aan op de te behandelen plek en één centimeter rondom (zie "Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling" hieronder). Dit mag gewoon met de vinger. Was na het aanbrengen van de crème uw handen met water en zeep.
- Efudix® mag niet met de slijmvliezen of met de ogen in contact komen.
- Gebruik niet tegelijkertijd huidproducten zoals crèmes, cosmetica of genees- middelen.
- Tenzij dit door de arts is voorgeschreven, mogen de behandelde delen niet bedekt worden met verbanden, gaasjes of pleisters.
- Vermijd zonlicht en ander UV-licht (zonnebank). Afhankelijk van de te behandelen lokatie is het advies om bijvoorbeeld een pet of kleding met lange mouwen te dragen.
- Tijdens de behandeling is douchen en de huid wassen geen probleem, maar liever zonder zeep.

Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling?

Wanneer gestart is met de Efudixcrème, wordt meestal vanaf de tweede week van de behandeling een reactie gezien aan de huid. als eerste symptoom is (vurige) roodheid te zien, gewoonlijk gevolg door vorming van blaasjes, vervelling, oppervlakkig wondjes en soms zelfs zweren.

Plekken in het gezicht en op de romp reageren meestal sneller van die aan handen, armen en benen.

Na het stoppen van de crème zal de huid langzaam herstellen. Soms treedt genezing pas 1 tot 2 maanden op nadat met de behandeling is gestopt.

De huid verandert alleen daar waar de crème is aangebracht. Wees niet ongerust en schrik niet als de huid kapot begint te gaan; dit is juist een teken dat Efudix® werkt. Stop hierom niet met de crème. Het is mogelijk dat ook nog niet zichtbaar aangedane plekken op uw huid, die in contact komen met de crème, rood en vurig worden.

Dat is omdat Efudix® ook zeer kleine beschadigingen aanpakt die nog niet met het blote oog te zien zijn. Tijdens de behandeling kunt u jeuk, een prikkend gevoel, branderigheid, irritatie, pijn, zwelling en (zelden) een bloeding van de huid krijgen. Als één van deze verschijnselen te ernstig wordt, neem dan contact op met uw arts. Indien de bijwerkingen

te ernstig zijn, zal uw arts adviseren om de crème minder vaak te gaan gebruiken.

U moet er rekening mee houden dat u een aantal weken (twee tot vier weken) rondloopt met rode vlekken en wondjes. Plan het dus in een rustige periode. Na de behandeling zal de huid binnen een aantal weken herstellen. Een controle afspraak maakt u in overleg met de arts.

Duur van de behandeling:

- *Oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom, ziekte van Bowen en actinische keratose:* twee maal daags gedurende drie tot zes weken (exacte duur wordt door voorschrijvend arts bepaald).
- *Wratten:* één tot vier dagen per week twee maal daags; zet de behandeling voort totdat de wratten niet meer zichtbaar zijn, maar minimaal zes weken.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

- T (020) 566 2530
- F (020) 566 9185
- E poli.dermatologie@amc.nl (voor niet-dringende zaken)
- Stuur een bericht via MyChart