

Medicijnen bij IVF-/ICSI-behandeling

Microgynon® 30

'De pil' wordt gebruikt in het lange protocol om de eierstokken tot rust te brengen. De toediening start op de derde of vierde cyclusdag.

Decapeptyl®

Decapeptyl® wordt gebruikt om de natuurlijke eisprong te onderdrukken. Het is een onderhuidse injectie die u eenmaal daags op een zelf te kiezen vast tijdstip in de avond injecteert. Toediening start in overleg met de arts.

Gonal-F®

Gonal-F® is een follikel stimulerend hormoon (FSH). Het wordt gebruikt om de eierstokken te stimuleren, waardoor de aanwezige eicellen kunnen rijpen.

Het is een onderhuidse injectie die u zelf injecteert, eenmaal daags op hetzelfde tijdstip als de Decapeptyl®. Toediening start in overleg met de arts. De dosis wordt individueel bepaald en kan bijgesteld worden naar aanleiding van de bevindingen bij het echoscopisch onderzoek en/of bloedonderzoek.

Ovitrelle®

Deze eenmalige injectie zet de allerlaatste eirijpingsfasen in gang. U krijgt een tijdstip waarop u de Ovitrelle® moet toedienen. Het is belangrijk dat u dit tijdstip precies aanhoudt omdat het tijdstip van het injecteren van de Ovitrelle® en het tijdstip van de punctie met elkaar zijn verbonden.

Utrogestan®

Deze capsules bevatten het hormoon Progesteron en zorgen ervoor dat uw baarmoederslijmvlies in een optimale conditie blijft na de punctie. Dit is belangrijk voor de innesteling van een embryo. U start aansluitend na de punctie met driemaal daags 200 mg. U brengt de capsules **vaginaal** in en gaat hier mee door tot en met de dag van de zwangerschapstest. Bij het doorgeven van de uitslag van de zwangerschapstest ontvangt u verdere instructies.

Foliumzuur

Foliumzuur verkleint de kans op aangeboren afwijkingen, met name Spina Bifida (open ruggetje). Het landelijk advies is om hiermee te starten wanneer u probeert zwanger te worden. Hier mag u dus al voor de IVF/ICSI-behandeling mee beginnen. U gaat hier mee door tot en met de tiende week van de eventuele zwangerschap.

Meer informatie

www.VUMc.nl/ivf