

November 2021

<b>Kinderen en adolescenten &lt;18</b> <b>Eerste consult</b> Verwijzingen van juli 2019 worden momenteel ingepland voor over 2-3 maanden. Datum verwijzing staat op uw verwijzing of kunt u bij de huisarts opvragen	<b>Tenminste 720 dagen*</b>	<b>Tenminste 103 weken*</b>
<b>Volwassenen &gt;18</b> <b>Eerste consult</b> Verwijzingen van mei 2019 worden momenteel ingepland voor over 3 maanden. Datum verwijzing staat op uw verwijzing of kunt u bij de huisarts opvragen	<b>Tenminste 720 dagen*</b>	<b>Tenminste 103 weken*</b>
<b>Start diagnostiek Kinderen en Adolescenten - psycholoog</b> Interne verwijzingen van maart 2021 worden momenteel ingepland voor over 2-3 maanden.	<b>Tenminste 186 dagen <sup>1)</sup></b>	<b>Tenminste 26 weken <sup>1)</sup></b>
<b>Start Diagnostiek Volwassenen – psycholoog</b> Interne verwijzingen van maart 2021 worden momenteel ingepland voor over 2-3 maanden.	<b>Tenminste 186 dagen <sup>1)</sup></b>	<b>Tenminste 26 weken <sup>1)</sup></b>
<b>Hormoonbehandeling</b>	<b>30 dagen <sup>2)</sup></b>	<b>4 weken <sup>2)</sup></b>
<b>Chirurgie * <sup>3) 4) 5)</sup></b> <b>Wachttijden gaan in vanaf het moment dat er aan alle gestelde voorwaarden is voldaan</b>		
<b><u>Vanwege de corona maatregelen zijn de wachttijden voor de chirurgie moeilijk te voorspel afgezegde operaties zullen als eerst weer ingepland worden wanneer dit weer mogelijk is.</u></b>		
Vaginaplastiek	<b>Tenminste 600 dagen</b>	<b>80 weken</b>
Darm vagina plastiek	<b>Tenminste 140 dagen</b>	<b>20 weken</b>
Borstvergroting	-	-
Secundaire correcties genitale chirurgie	<b>Individueel <sup>11)</sup></b>	<b>Individueel <sup>11)</sup></b>
Adamsappel correctie	<b>Tenminste 112 dagen <sup>7)</sup></b>	<b>16 weken <sup>7)</sup></b>
Stem verhogende operaties	<b>Tenminste 112 dagen <sup>7)</sup></b>	<b>16 weken <sup>7)</sup></b>
Aangezichtschirurgie	<b>Tenminste 720 dagen <sup>10)</sup></b>	<b>104 weken <sup>10)</sup></b>
Borstverwijdering (mastectomie)	<b>Tenminste 154 dagen <sup>8)</sup></b>	<b>22 weken <sup>8)</sup></b>
Borstverwijdering i.c.m. het verwijderen van baarmoeder en eierstokken (combi operatie)	<b>Tenminste 310 dagen <sup>8)</sup></b>	<b>44 weken <sup>8)</sup></b>
Verwijdering baarmoeder en eierstokken	<b>Tenminste 200 dagen</b>	<b>28 weken <sup>8)</sup></b>
Verwijderen van vagina (Colpectomie)	<b>Tenminste 200 dagen <sup>9)</sup></b>	<b>28 weken <sup>9)</sup></b>
Verwijdering baarmoeder en verwijdering van vagina (robot operatie)	<b>Tenminste 310 dagen <sup>8) 9)</sup></b>	<b>44 weken <sup>8) 9)</sup></b>
Metaïdoioplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)	<b>Tenminste 230 dagen <sup>8)</sup></b>	<b>42 weken <sup>8)</sup></b>
Phalloplastiek (met/zonder plasbuisverlenging)	<b>Tenminste 830 dagen <sup>8)</sup></b>	<b>118 weken <sup>8)</sup></b>

\*Door de grote toename van verwijzingen is een lange wachttijd ontstaan. Zowel voor de intake als voor chirurgische ingrepen is de aangegeven wachttijd een indicatie en hieraan kunnen nadrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Voor opnames die op de MPU moeten staan voor alle ingrepen veel langere wachttijden . Dit komt o.a door de beperkte bedden capaciteit ende weinige operatie sessies die we in het vumc hebben.

### **Disclaimer wachttijden/wachtljsten**

- De daadwerkelijke wachttijd kan voor een individuele patiënt anders zijn dan hier staat gepubliceerd. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld genomen moet wachten.
- De wachttijden betreft het gemiddelde van een specialisme of behandeling. Indien u voorkeur heeft voor een bepaalde specialist kan dat betekenen dat de wachttijd langer is.
- De gepresenteerde wachttijden gelden niet voor acute zorg.
- Er worden veel meer patiënten naar onze polikliniek verwezen dan wij kunnen zien. Het team heeft de behandelcapaciteit de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid, maar ook daaraan zit een grens. Daarnaast gaat het om een langdurig en gecompliceerd proces waarbij veel zorgverleners betrokken zijn. Dus ook waar de endocrinoloog en de chirurg in beeld komen kunnen (extra) wachttijden ontstaan. Personeelstekorten in de zorg in het algemeen, op de OK in het bijzonder, benodigde opleidingstijd voor nieuwe medewerkers en financiële beperkingen remmen de groei van behandelcapaciteit en het verkorten van de wachttijden. Ook de functie van het Amsterdam UMC als academisch ziekenhuis heeft invloed op de wachttijd.
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens over de wachttijden.

- 1) De aangegeven wachttijd is de gemiddelde wachttijd tussen intake en start diagnostiek.
- 2) De aangegeven wachttijd is een gemiddelde wachttijd en kan individueel verschillen.
- 3) De aangegeven wachttijden gelden vanaf het moment dat patiënt op de wachtlijst is geplaatst en dus aan alle voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden betreffen o.a. genitale epilatie voor MV transgenders, epilatie van de donorsite van de phalloplastiek voor VM transgenders, goed ingestelde bijkomende aandoeningen (b.v. diabetes ), een verantwoord gewicht en, indien van toepassing, gestopt zijn met roken. Daarnaast wordt de wachttijd onder meer bepaald door de functie van het Amsterdam UMC als academisch ziekenhuis en beschikbaarheid van zorgverleners.
- 4) Normaliter wordt een periode van ca. 3 maanden tussen twee operatieve ingrepen aangehouden.
- 5) De wachttijd voor een operatie is mede afhankelijk van beschikbaarheid chirurg.
- 6) Mamma augmentatie (borstvergroting) wordt in Nederland niet vanuit het basispakket vergoed. In VUmc wordt er geen combinatie operatie met een vaginaplastiek uitgevoerd. Een borstvergroting kan wel door de plastisch chirurgen van het Amsterdam UMC worden uitgevoerd, maar deze vindt dan plaats in de Jan van Goyen kliniek na consultatie in het Amsterdam UMC.
- 7) Er worden ook KNO operaties in centra uitgevoerd die niet verbonden zijn aan genderteams.
- 8) De afdeling Plastische Chirurgie van Amsterdam UMC opereert regelmatig in de Jan van Goyen Kliniek te Amsterdam. Ook opereren zij, evenals de afdeling Gynaecologie, in het Amstelland Ziekenhuis zodat meer OK capaciteit binnen Amsterdam UMC beschikbaar blijft voor grote complexe chirurgie. Mastectomieën worden meestal in de Jan van Goyen Kliniek uitgevoerd. In sommige gevallen acht het genderteam een operatie buitenshuis niet verstandig.
- 9) Een colpectomie moet uitgevoerd worden voorafgaand aan een metaïdoioplastiek of phalloplastiek waarbij ook een plasbuis wordt geconstrueerd.
- 10) De ingreep bestaat uit tenminste twee stappen. Vaak zijn meer dan twee operaties nodig.

<sup>11)</sup> Kan alleen op basis van de dan geldende vraag bepaald worden

NB. Contact opnemen met uw behandelteam kan via Mijn Dossier, hier kunt u uw medische inhoudelijke en vragen rondom uw afsprakenplanning stellen.